


**Monitoraggio della *Tortrice precoce del castagno* (*Pammene fasciana*)
su alcune aziende castanicole pilota dell'Area dei Monti Cimini
(provincia di Viterbo) a diversa altimetria ed esposizione**



Iniziativa realizzata nell'ambito del
“Tavolo tecnico istituzionale sulle problematiche della castanicoltura della
provincia di Viterbo”
costituito su iniziativa della CCIAA di Viterbo



Data Controllo		12.06.2013		
Azienda		Comune	N. Insetti	Note
Azienda_f	1	Viterbo		
Trappola	1		3	
Trappola	2		7	
Trappola	3		14	
Azienda_p	2	Caprarola		
Trappola	1		23	
Trappola	2		29	
Trappola	3		21	
Trappola	4		14	
Azienda_v	3	Caprarola		
Trappola	1		19	
Trappola	2		5	
Trappola	3		3	
Trappola	4		1	
Azienda_p	4	Caprarola		
Trappola	1		32	
Trappola	2		4	
Trappola	3		8	
Azienda_{p2}	5	Carbognano		
Trappola	1		5	
Trappola	2		0	
Trappola	3		16	
Azienda_d	6	Carbognano		
Trappola	1		1	
Trappola	2		2	
Trappola	3		2	
Azienda_s	7	Caprarola		
Trappola	1		6	
Trappola	2		4	
Trappola	3		1	
Trappola	4		6	
Trappola	5		6	
Azienda_i	8	Ronciglione		
Trappola	1		13	
Trappola	2		5	
Trappola	3		2	
Trappola	4		15	
Trappola	5		3	
Trappola	6		8	
Trappola	7		28	
Trappola	8		9	
Azienda_c	9	Viterbo		Rilievo effettuato in data 13.06
Trappola	1		5	
Trappola	2		19	
Trappola	3		7	
Trappola	4		6	
Trappola	5		2	

Le catture del **quinto controllo** (12-13.06.2013) evidenziano un generalizzato **aumento della popolazione** adulta dell'insetto, anche se l'andamento climatico registrato in precedenza potrebbe aver procrastinato il picco degli sfarfallamenti. In alcuni casi - come è ben visibile nella scheda di rilevazione - la situazione appare degna della **massima attenzione**. Si consiglia pertanto agli agricoltori di rivolgersi tempestivamente al proprio tecnico di fiducia per una valutazione puntuale. E' bene inoltre ribadire che per eventuali interventi di contenimento si consiglia l'uso di prodotti con un basso effetto nei confronti dei parassitoidi naturali.